

سوالات آزمون ارشد پرستاری 97

رشته امتحانی	داخلی - جراحی	کودکان	بهداشت مادران و نوزادان	بهداشت جامعه	روان پرستاری	زبان عمومی
روان پرستاری	۲	۲	۲	۲	۴	۲
پرستاری داخلی - جراحی	۴	۲	۲	۲	۲	۲
پرستاری سلامت جامعه	۲	۲	۲	۴	۲	۲
پرستاری کودکان	۲	۴	۲	۲	۲	۲
پرستاری نظامی	۳	۲	۲	۲	۳	۲
پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان	۳	۳	۳	۲	۱	۲
پرستاری توانبخشی	۳	۲	۲	۲	۳	۲
پرستاری اورژانس	۴	۲	۲	۲	۲	۲
پرستاری مراقبت‌های ویژه	۴	۲	۲	۲	۲	۲
پرستاری سالمندی	۴	۱	۱	۳	۳	۲
مدیریت پرستاری	۲	۲	۲	۴	۲	۲

داخلی جراحی

۱- یکی از مهم ترین ملاحظات پرستاری در انفوزیون پتاسیم وریدی به بیمار، کنترل کدام است؟

الف) ریتم تنفسی

ب) بازده ادراری

ج) فشار خون

د) نوار قلبی

۲- جهت کاهش و پیشگیری از تجمع ترشحات اطراف لوله تراکئوستومی، مهم ترین اقدام پرستاری کدام است؟

الف) تشویق بیمار به انجام تنفس عمیق و دیافراگمی

ب) افزودن نرمال سالین به پانسمان اطراف استوما

ج) استفاده از دستگاه بخور و نبولایز تراپی

د) گذاشتن گاز وازلین در اطراف استوما

۳- کدام اقدام پرستاری در بیمار با فشار بالای مغزی (ICP) صحیح نمی باشد؟

الف) هیپرونتیله کردن بیمار

ب) قرار دادن بیمار در پوزیشن نیمه نشسته

ج) حفظ تعادل منفی مایعات

د) تهویه مکانیکی با استفاده از PEEP

۴- برای جلوگیری از Dumping syndrome، دمای مایع گاوآژ کدام است؟

الف) کاملاً سرد

(ب) بالاتر از دمای اتاق

(ج) کمتر از دمای اتاق

(د) در سطح دمای اتاق

۵- در صورتی که بیماری در ساعت ۸ صبح، ۱۵ واحد انسولین کریستال مصرف کند، در کدام ساعت بیشترین احتمال بروز هیپوگلیسمی وجود دارد؟

(د) ۱۰ PM

(ج) ۱۰ AM

(ب) ۵ PM

(الف) ۸ PM

۶- در سالمندان اغلب علائم تیپیک عفونت ادراری دیده نمی‌شود. علامت غیراختصاصی احتمال عفونت ادراری در سالمندان کدام است؟

(د) درد مفاصل

(ج) سردرد

(ب) تهوع

(الف) بی‌اشتهایی

۷- به کدام یک از بیماران مبتلا به دیابت اجازه ورزش داده می‌شود؟

(الف) بیمار در وضعیت NPO

(ب) بیمار چاق مبتلا به دیابت نوع II

(ج) سطح گلوکز بیمار بالاتر از $mg/dl 250$

(د) سطح گلوکز بیمار پایین‌تر از $mg/dl 100$

۸- برای درمان فوری و موقتی هیپرکالمی در بیمار دچار نارسایی کلیه اقدام مناسب کدام است؟

(الف) دکستروز و انسولین

(ب) دیالیز صفاقی یا دیالیز خونی

(ج) مصرف آنتی‌اسید منیزیم‌دار

(د) تجویز سرم نمکی هیپرتونیک

۹- در مبتلایان به نارسایی مزمن کلیوی تحت درمان با اریتروپوئیتین، احتمال بروز کدام عارضه نیاز به ارزیابی دقیق و اقدام فوری را ضروری می‌سازد؟

الف) هیپوتانسیون

ب) هموسیدروزیس

ج) احتمال خونریزی

د) بروز تشنج

۱۰- در آموزش قبل از ترخیص به بیمار مبتلا به IBD (بیماری مزمن التهابی روده) کدام یک از موارد زیر را توصیه می‌کنید؟

الف) مصرف غذاهای پرپروتئین، کم‌چربی و کم‌باقیمانده

ب) مصرف شیر و لبنیات و مکمل‌های غذایی

ج) اجتناب از مصرف غذاهای گرم و محرک

د) مصرف غذاهای پرپروتئین، پرچرب و سرشار از ویتامین

۱۱- پوزیشن مناسب بیمار غیرهوشیار بعد از جراحی کاتاراکت چشم راست کدام است؟

الف) نیمه‌نشسته

ب) خوابیده به پهلو چپ

ج) خوابیده به پهلو راست

د) صاف به پشت

۱۲- پوزیشن مناسب جهت بیمار مبتلا به پریتونیت کدام است؟

الف) نیمه‌نشسته با زانوهای خمیده

ب) خوابیده به پشت

ج) خوابیده به پهلو با زانوهای خمیده

(د) پرون پوزیشن (دمر)

۱۳- رفلکس کوشینگ در پاسخ به کدام تغییر زیر به وجود می آید؟

الف) افزایش ICP

ب) ادم مغزی

ج) پرکاری غده آدرنال

د) کاهش سطح هوشیاری

۱۴- رژیم غذایی مددجویی که به دلیل کم کاری غده پاراتیروئید دچار هایپوکلسمی شده، کدام است؟

الف) مصرف زیاد پنیر و ماست و شیر و سبزیجات برگدار

ب) محدودیت مصرف شیر و فرآورده های لبنی و تجویز مکمل های کلسیم

ج) مصرف زیاد شیر و لبنیات همراه با ویتامین D و پروتئین فراوان

د) مصرف زیاد پروتئین و سبزیجات برگدار همراه با ویتامین D

۱۵- در مراقبت از بیمار پس از جراحی قلب، پرستار کدام یک از علائم پوستی زیر را نشانه کاهش برون ده قلبی می داند؟

الف) پوست خنک و تیره

ب) پوست گرم و تیره

ج) پوست خنک و روشن

د) پوست گرم و روشن

۱۶- پرستار در بیمار مبتلا به نارسایی قلبی که از مهار کننده های ACE استفاده می کند، کدام یک از موارد زیر را بایستی انتظار داشته و پایش نماید؟

د) هیپرکالمی

ج) هیپرناترمی

ب) هیپرتانسیون

الف) تاکیکاردی

۱۷- کدام مورد جزء اهداف پر کردن کاف داخل تراشه نمی باشد؟

الف) ثابت کردن لوله

ب) جلوگیری از آسپیراسیون

ج) حفظ فشار داخل ریه

د) جلوگیری از باروتروما

۱۸- در سیستم پرچسب رنگی (تریاز)، کدام رنگ به معنی فوریت های تأخیری یا (delayed) بوده و مربوط به مددجویانی است که می توان مداخلات درمانی را در مورد آنها حتی ۴ الی ۶ ساعت به تأخیر انداخت و نیاز به درمان اورژانس ندارند؟

الف) زرد ب) قرمز ج) سبز د) آبی

۱۹- اولین اولویت در مراقبت پرستاری در خونریزی های دستگاه گوارش کدام است؟

الف) اکسیژن درمانی

ب) جایگزینی مایعات

ج) بررسی رنگ استفراغ و مدفوع

د) تزریق آنتی اسید

۲۰- مهم ترین عارضه به دنبال تزریق گلوکونات کلسیم کدام است؟

الف) نکروز بافت زیر جلد

ب) رنگ پریدگی

ج) تاکیکاردی

د) کاهش دفع ادراری

۲۱- تغییرات حاصله از آنفارکتوس کامل ناحیه لترال قلب در کدام یک از اشتقاق‌های زیر دیده می‌شود؟

الف) $V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6$

ب) II, III, aVF

ج) I, aVL, V_1, V_2

د) I, aVL, V_5, V_6

۲۲- خصوصیات درد قفسه سینه ناشی از آنژین صدری پایدار کدام است؟

الف) درد غیرقابل پیش‌بینی با آستانه درد پائین‌تر از حد معمول

ب) درد قابل پیش‌بینی و ثابت وابسته به فعالیت و استراحت

ج) درد ناشی از اسپاسم عروق کرونر که ارتباطی با فعالیت و استراحت ندارد

د) درد غیرقابل پیش‌بینی که ارتباطی با فعالیت و استراحت ندارد

۲۳- در مراحل اولیه سوختگی کدام اختلال الکترولیتی رخ می‌دهد؟

الف) هیپوناترمی - هیپرکالمی

ب) هیپرناترمی - هیپوکالمی

ج) هیپوناترمی - هیپوکالمی

د) هیپرناترمی - هیپرکلسمی

۲۴- اولین اقدام درمانی در بیمار مبتلا به کتواسیدوز دیابتی (DKA) کدام است؟

الف) کنترل ریتم قلبی

ب) مدیریت هیپرکالمی

ج) تصحیح الکترولیت‌ها

د) مدیریت هیپرگلیسمی

کودکان

۲۵- داروی دارویی و مضر و خطرناک در باز توانی م*iuèchi*، (PDA) در نوزادان کدام است؟

الف) پروپرانولول

ب) سالبوتامول

ج) ایندومتاسین

د) نیتروگلیسرین

۲۶- اگر کودکی به دلیل نگرانی از معلمین بترسد از مدرسه جات، اجتناب کند و از نظر تکانشی کاهش می‌دهد در کدام مرحله به سر می‌برد؟

الف) ژنوتازی؛ مرحله سوم

ب) تقوید، مراحل به مرحله چرخ

ج) پیش، فراغتی؛ مرحله چهارم

د) پیش، فراغتی؛ مرحله پنجم

۲۷- هنگام اجرای تفحصی و درد شایع ترین بخش‌های از پایین ترونی، جنبشی در کدام است؟

الف) جلدی

ب) آپاراتی پیش ادرار

ج) زیر سینه و تنه و در سینه

د) پس دیواره

۲۸- بعد از اسهال ایامور و آفرین، در نقاط آییی شدت کدام مورد از قبیل ماده لوله کرده پوسته سوئم تا ت دهدکبک تکان دهد به کدام کنترل بازگزر بهترین است؟

الف) کارگری کار از روی برای به دادن ماده مورها

ب) توقف از کنترل آیی به و سکت مترها

ب) توقف از کنترل آیی به و سکت سوختنی های

ج) بوردیک و روانکهای توره

***۲۹- شدت خواص و یاخت پس روی بول برای پرویروهای گلوکد تکینی دهان ها در از چه تا ۲۴۰ معلا چپ و یاخت دیر

الف) مرده

ب) خیار

۳۰- مصرف فیزیوسلام دهان در گرون ریه مبتلا به کدام مصرفی صروح است؟

الف) اشتیریوئین ترین کولار

ب) اشیره ویلازی

ج) اشیره کونوری

د) سیرویلالیک رونی

۳۱- هنگی وروما لایک آنتی آد در سال بر ۲۰۴۸ چقدر شدند از ترون ماریان های تیرانی، پیداشیت کدام است؟

الف) کاهش تایید آنتی آد، در برازنه سازی ماس

ب) کاهش قابل، بینی استفاد در تیمارهای

ج) کماهل روته، سمنه، و آی بیل

د) روید افزایشی در آی کثر و شکینی

۳۲- بستری اش اجرای ورود لازم هایی اقیانگ و به دنبال فیضان بخشی خاصی نوروتاونی پنه روانی است؟

الف) دو ماقله باید از شدت نتیجه پیش سده

ب) او مرفیه باید از بیوتی پیش زوت

ج) یک اند ماقله از پیش دیر پیش برده ها

(د) یک‌اند ماقله از شدت پیش‌برده‌ها

۳۳- افسردگی‌های در حلقیه کدام است؟

الف) تجمع روانی محد

ب) محدودیت بیوتئی

ج) احتمال در سرو، خوابی

د) تطویه می‌زار، تنب‌سازی

۳۴- کدام دارو در درمان بی‌توجهی، در آوادی، در پریشتی، انقلابی (ADHD) تذکر تبرقه در مورد کدام مارینه جایگاه نخواهد داشت؟

الف) تثبیت

ب) هالوپریدول

ج) پری‌کلیندان

د) فنوباریتال

**۳۵- امسودیتال

۳۵- امسودوسیس موجودی بر و تواند مبادلات به بارد نوی ۱ باشد کدام است؟

الف) احتقاقا، مامع، درجه یک بوسیل بویلار

ب) اومیان، ایست، کنترل، ستراقی

ج) احتقاقا، تیور، بخت، آفراخی، فیزیان

د) احتقاقا، زرد، خرفت‌مایل، بی‌ماری

۳۶- در کودک مبتلا به لاکنیکه‌اوم در دریچه‌ها، نقصه نبسته، سوژه و تحویل، شانهای، خراشی و به کدام است؟

الف) تخویق، آزمون تارت‌ها

ب) جلب، توجه‌رهیسی

(ج) وربیک، افسان دایی

(د) خیروور، نوس

۳۷- نظار، تریلی‌کندی و رشتنه از خورده‌ان از اسپوزفاهی، جیری کدام است؟

الف) آزاری، اسیر، رشتنه، بدون

ب) دو، توجه دادن، و آزیم

ج) تهیه، رقص‌ری، و ناظبان

د) سوئره، تنه، همی‌ها، ریشه‌ها

۳۸- در کودک مبتلا به انزروهای رست، در ترون‌اری به پریاناتلل لبری، سروله، مافله از بلند و دامه می‌شود؟

الف) ترون‌کردن تجارب، مربوطه به دادن، تاریخی

ب) ترون‌کردن تیری، و رفتاری، در قارا

ج) ترون‌کرون، ماده، تجارب، تربیت، آی‌کثر

د) ترون‌کوته، تیرویی، تجارب در ۸ تا ۱۱

۳۹- در کودک مبتلا به نیومونی میکروپلاسمایی، نشانه‌های، عف‌ها، فاقات دارویی کدام است؟

الف) تربیه‌شده - خارش - اسهال - آفراخت

ب) کنووز - نیورون‌ها - ترومبوز - خروم

ج) سرد، قلان - کافی، ثیاشا - نوبت، آفراخت

د) کاهش ورت - اسهال - دوکتوز - تنب‌الف

۴۰- کدام یک از عوامل زیر کودک ۵ ماهه را نسبت به صدمات، آسیب‌پذیر می‌کند؟

الف) عدم تکامل عضلات گردنی همراه با بزرگی سر

ب) کبد و طحال بزرگ و قوس دنده‌ای پهن

ج) عدم تکامل حواس بینایی و شنوایی

د) جثه کوچک و صافی کف پای کودک

۴۱- اقدام صحیح در دادن شربت دیگوکسین به شیرخوار کدام است؟

الف) دادن دارو همزمان با مصرف غذای فاقد کلسیم

ب) ندادن دارو در صورت گذشت بیش از ۴ ساعت از زمان مصرف

ج) تکرار دوز مصرفی در صورت استفراغ کودک پس از مصرف

د) دادن دارو به همراه آب قند یا دکستروز ۵ درصد

۴۲- علامت وجود درد در نوزاد ۱۰ روزه کدام است؟

الف) افزایش عمق تنفس

ب) کاهش فشار خون

ج) سرد شدن پوست

د) کاهش درصد اشباع اکسیژن

۴۳- اقدام اصلی در نوزادی که با اولین تغذیه دچار علائم خفگی گردیده، کدام است؟

الف) قطع تغذیه دهانی

ب) شروع مایعات وریدی

ج) بالا بردن سر نوزاد

د) ساکشن نوزاد

۴۴- در کودک مبتلا به هموفیلی که دچار زمین خوردگی شده، مهم‌ترین اقدام حمایتی، کدام است؟

الف) از حرکات ROM در اندام استفاده کند.

ب) حداقل ۲ دقیقه محل صدمه را فشار دهد.

(ج) اندام را بالاتر از سطح قلب نگه دارد.

(د) از کمپرس گرم و مرطوب استفاده کند.

۴۵- شیوهی برقراری ارتباط کلامی برای کاهش رفتار منفی گرایانه کودک نوپا کدام است؟

(الف) مهربان و ملاحظه‌گرانه در جهت دادن اختیار

(ب) قاطعانه و دستوری برای کنار گذاشتن رفتار

(ج) تکرار مرتب قوانین و سلب اختیار از کودک

(د) نادیده گرفتن کودک و به تعویق انداختن خواسته وی

۴۶- هدف اولیه از انجام جراحی کریپتورکیدیسم کدام است؟

(الف) جلوگیری از آسیب بیضه‌ها و احتمال ناباروری

(ب) جلوگیری از پیچ‌خوردگی احتمالی بیضه

(ج) بهسازی ظاهر اندام تناسلی از نظر روانی

(د) پیشگیری از بدخیمی احتمالی بیضه‌ها

۴۷- در بروز رفتارهای نادرست کودکان سن مدرسه کدام عامل نقش موثرتری دارد؟

(الف) خودمحوری و تلاش برای برتری یافتن بر همسالان

(ب) تلاش برای برآورده کردن انتظارات دیگران

(ج) عدم توانمندی برای تمایز رفتار درست و نادرست

(د) مقایسه با همسالان و الگوپذیری از دیگران

۴۸- در مورد مدیریت اضطراب جدایی در کودکان زیر پنج سال بستری در بیمارستان، مناسب‌ترین اقدام پرستاری هنگام ترک والدین کدام است؟

(الف) تقسیم زمان ملاقات به فواصل بیشتر و مدت کوتاه‌تر

(ب) توصیه به خواباندن کودک و سپس ترک او در زمان خواب

ج) تقاضا از والدین برای قرار دادن اسباب بازی های آشنای او در تخت

د) اعلام زمان ترک و زمان بازگشت به کودک منطبق با فعالیت هایی مثل ناهار

۴۹- در معاینه فیزیکی نوزاد، اگر اندازه قریه بیش از یک سانتی متر باشد، احتمال کدام یک از موارد زیر مطرح می شود؟

الف) کاتاراکت

ب) گلوکوم

ج) نیستگموس

د) استرابیسم

۵۰- شایع ترین علامت بالینی در نوزاد مبتلا به فتق دیافراگمی مادرزادی، کدام است؟

الف) کاهش برون ده قلب

ب) نارسایی حاد تنفسی

ج) ریفلاکس معده

د) نفخ شکمی

۵۱- اولین و شایع ترین نشانه دیسترس تنفسی در نوزادان کدام است؟

الف) رتراکسیون قفسه سینه

ب) سیانوز

ج) تنفس بیش از ۶۰ بار در دقیقه

د) صدای ناله انتهایی دمی

۵۲- کدام یک از عوامل زیر می تواند سبب تشدید سوزش سر دل (Heartburn) در زن باردار شود؟

الف) غذاهای کم کالری

ب) خستگی

(ج) استعمال دخانیات

(د) کم‌آبی

۵۳- بیماری یک ساعت بعد از زایمان دچار کاهش فشار خون و تاکیکاردی می‌شود، خون‌ریزی واضح ندارد و از درد شدید پرینه و احساس دفع شکایت دارد. تشخیص احتمالی شما کدام است؟

(الف) باقی ماندن قطعه‌ای از جفت

(ب) پارگی رحم

(ج) هماتوم ولوو و واژن

(د) اختلال انعقادی

۵۴- در هنگام بررسی نوزاد دختر، کدام یافته غیرطبیعی محسوب می‌شود؟

(الف) خون‌ریزی از واژن

(ب) عدم دفع مکنونیوم در ۲۴ ساعت اول

(ج) بزرگی کلیتوریس و برجسته بودن لب‌های کوچک

(د) تورم و سفتی پستان‌ها

۵۵- تزریق کدام واکسن در دوران بارداری ممنوع است؟

(الف) سرخک (ب) کزاز (ج) دیفتی (د) هپاتیت B

۵۶- خانمی ۲۸ ساله به کلینیک ناباروری مراجعه کرده است. در شرح حال، سابقه قاعدگی نامرتب داشته و در مشاهده، هیرسوتیسم و چاقی مشخص است. تشخیص احتمالی و اقدام مناسب بعدی کدام است؟

(الف) سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و درخواست سونوگرافی

(ب) وزن نامناسب و ارجاع به متخصص تغذیه

(ج) اختلالات غددی و ارجاع به متخصص غدد

(د) اختلالات لوله‌ای و توصیه به هیستروسالپینگوگرافی

۵۷- خانم ۳۵ ساله بارداری اول، ۳۰ هفته با سردرد و تاری دید مراجعه کرده است. فشار خون ۱۱۰/۱۶۰ و پروتئینوری ۳+ گزارش شده است، تشخیص احتمالی کدام است؟

(الف) هیپرتانسیون مزمن

(ب) پره‌اکلامپسی شدید

(ج) هیپرتانسیون بارداری

(د) سندرم نفروتیک

۵۸- تفاوت مراقبت پرستاری در جفت سر راهی و دکولمان جفت کدام است؟

(الف) کنترل علائم حیاتی

(ب) مانیتور ضربان قلب جنینی

(ج) بررسی وضعیت انعقادی

(د) بررسی حجم خونریزی

۵۹- در زن باردار با سن حاملگی ۱۰ هفته که با لکه‌بینی مراجعه کرده و در معاینه، دهانه رحم باز و در سونوگرافی محصول بارداری زنده وجود دارد، نوع سقط کدام است؟

(الف) اجتناب‌ناپذیر

(ب) فراموش‌شده

(ج) ناقص

(د) تهدید به سقط

۶۰- کدام پوزیشن در هنگام خواب، خطر وقوع سندرم مرگ ناگهانی نوزاد را افزایش می‌دهد؟

(الف) خوابیده به پشت یا پهلو

(ب) خوابیده به پهلو

ج) خوابیده به پشت

د) خوابیده روی شکم

۶۱- دلیل عدم جدا کردن جفت در زمان رخداد واریونگی رحم کدام است؟

الف) منجر به خونریزی زیاد می شود

ب) دردناک است

ج) امکان پذیر نیست

د) جفت قابل تشخیص نیست

۶۲- تعریف مرحله دوم زایمان کدام است؟

الف) خروج جنین تا خروج جفت

ب) تکمیل دیلاتاسیون سرویکس تا خروج جفت

ج) تکمیل دیلاتاسیون سرویکس تا خروج جنین

د) شروع دردهای زایمانی تا خروج جنین

۶۳- در معاینه نوزاد به دنبال زایمان طولانی، قسمتی ادماتو روی جمجمه نوزاد لمس می شود که محدود به یک استخوان نیست. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) کاپوت ساکسیدانثوم

ب) سفال هوماتوم

ج) مولدینگ

د) اکیموز

۶۴- رژیم قابل قبول کورتیکواستروئیدها برای زایمان زودرس (کمتر از ۳۴ هفته) کدام است؟

الف) بتامتازون ۱۲ میلی گرم هر ۲۴ ساعت دو روز

(ب) بتامتازون ۵ میلی گرم هر ۱۲ ساعت چهار روز

(ج) دگزامتازون ۵ میلی گرم هر ۲۴ ساعت دو روز

(د) دگزامتازون ۸ میلی گرم هر ۱۲ ساعت ۴ روز

۶۵- هنگام مشاهده الگوی افت زودرس ضربان قلب جنین، اقدام مناسب کدام است؟

(الف) خواباندن مادر به پهلوی چپ

(ب) رساندن اکسیژن به مادر

(ج) اقدام خاصی لازم نیست

(د) قطع سنتوسینون

۶۶- افت متغیر ضربان قلب جنین با کدام مورد مرتبط است؟

(الف) نارسایی جفت

(ب) اولیگوهایدرآمنیوس

(ج) فشار روی سر جنین

(د) تحریک عصب واگ

۶۷- هدف از انجام ورزش های پس از زایمان کدام است؟

(الف) کاهش کمردرد

(ب) کاهش چربی های شکم و پهلوی

(ج) بهبود تونیسیتة عضلانی

(د) افزایش توده عضلانی

۶۸- خانمی ۲۸ ساله با بارداری ۱۴ هفته مراجعه کرده است. در سونوگرافی حرکات قلب جنین دیده نمی شود، دارای

ترشحات واژینال قهوه ای رنگ است، تشخیص کدام است؟

(الف) سقط ناقص

(ب) سقط فراموش شده

(ج) حاملگی نابجا

(د) مول هیداتیفرم

۶۹- علت اولیه خونریزی زودرس بعد از زایمان (دوران نفاس) کدام است؟

الف) باقی ماندن قسمت‌هایی از جفت

(ب) شلی رحم

(ج) جدا شدن لخته از محل جفت

(د) باز شدن محل اپیزیاتومی

۷۰- جهت پیشگیری از سندرم آسپیراسیون مکونیوم در هنگام تولد، اقدام مناسب کدام است؟

الف) اکسیژن‌رسانی

(ب) دادن سورفاکتانت مصنوعی

(ج) آمنیوتومی حین زایمان

(د) ساکشن فوری مجاری هوایی

۷۱- مهم‌ترین مراقبت اولیه و فوری در استفراغ‌های و خیم حاملگی کدام است؟

الف) آمادگی سریع جهت زایمان

(ب) محدودیت فعالیت مددجو

(ج) کنترل علائم حیاتی و دارودرمانی

(د) NPO بودن و شروع IV تراپی

۷۲- در کدام رفلکس هنگامی که نوزاد به پشت قرار دارد و سر وی به یک طرف چرخانده شود، اندام‌های همان سمت اکستانسیون و طرف مقابل فلکسیون پیدا می‌کند؟

الف) تونیک گردنی

ب) مورو

ج) بابینسکی

د) پاراشوت

بهداشت جامع

۷۳- برای بررسی پیامدهای ناشی از یک عامل خطر، کدام مطالعه توصیه می‌شود؟

الف) گزارش موردی

ب) کوهورت

ج) مورد شاهدی

د) مقطعی

۷۴- در کدام محیط نقش پرستار سلامت جامعه در کاهش مخاطرات سلامتی، اهمیت بیشتری دارد؟

الف) مدارس

ب) منازل

ج) محیط‌های کاری

د) مراکز مشاوره خدمات پرستاری

۷۵- مهم‌ترین هدف از انجام برنامه غربالگری توسط پرستار سلامت جامعه کدام است؟

الف) برنامه‌ریزی جهت آموزش سریع بیماران

ب) شروع برنامه توانبخشی در بیماران

ج) کاهش عوارض بیماری مسری

د) تشخیص زودرس و به‌موقع بیماری

۷۶- تلقیح کدام واکسن در افراد دارای ایدز ممنوع است؟

- الف) کزاز ب) هیپاتیت ج) سل د) دیفتی

۷۷- پرستار سلامت جامعه قصد دارد ارتباط بین خودکشی و اعتیاد به مواد مخدر را از طریق یک مطالعه مورد شاهدهی بسنجد. کدام یک از موارد زیر در مطالعه مشخص می شود؟

الف) نسبت شانس

ب) نسبت خطر

ج) نسبت بروز

د) خطر نسبی

۷۸- بهترین راه محافظت انسان در مقابل بیماری هاری کدام است؟

الف) واکسیناسیون همگانی افراد

ب) واکسیناسیون حیوانات اهلی

ج) شناسایی و از بین بردن حیوانات آلوده

د) تزریق سرم و واکسن هاری در صورت لزوم

۷۹- آقای رصدی به دنبال افتادن از روی درخت و فرو رفتن شیء نوک تیز در پا دچار جراحت عمیق شده است. در صورت وجود سابقه واکسیناسیون ناقص در شرح حال وی، کدام اقدام صحیح است؟

الف) تزریق تتانوبولین و واکسن dT

ب) تزریق تتانوبولین

ج) واکسیناسیون با واکسن dT

د) شستشوی زخم و تزریق تتانوبولین

۸۰- کدام یک از موارد زیر دارای اثر باقیمانده برای تأثیر بر میکروارگانیسم های آب های آشامیدنی می باشد؟

- الف) ازن ب) کلر ج) فرابنفش د) جوشاندن

۸۱- در کدام رویکرد پرستاری خانواده، توجه اصلی به فرد است و سپس کل خانواده مورد توجه قرار می‌گیرد؟

الف) خانواده به‌عنوان سیستم

ب) خانواده به‌عنوان مددجو

ج) خانواده به‌عنوان جزئی از جامعه

د) خانواده به‌عنوان زمینه

۸۲- توانایی آزمون غربالگری در شناسایی درست کسانی که بیماری را ندارند، کدام است؟

الف) ارزش اخباری منفی

ب) تکرارپذیری

ج) ویژگی

د) حساسیت

۸۳- مهم‌ترین عامل موفقیت در فرآیند بازدید منزل کدام است؟

الف) ارتباط مؤثر

ب) امکانات و تجهیزات

ج) ارزیابی مقدماتی

د) مداخلات تیمی

۸۴- در طراحی یک برنامه آموزشی توسط پرستار، اولین گام کدام است؟

الف) ارزیابی توانایی‌های یادگیرنده

ب) تعیین نیاز آموزشی

ج) انتخاب یک تئوری

د) انتخاب یک مدل

۸۵- دشواری در بلع (دیسفاژی)، دوبینی، پتوزیس، تاری دید و ضعف ماهیچه‌ها، علائم مسمومیت با کدام است؟

الف) کلوستریدیوم پرفرنژنس

ب) استافیلوکوک

ج) سالمونلا

د) بوتولیسم

۸۶- کدام نوع پیشگیری، در اولین مرحله ممکن برای تشخیص و رفع مشکلات موجود سلامتی صورت می‌گیرد؟

الف) اولیه ب) ثالثیه ج) ثانویه د) مقدماتی

۸۷- کدام مورد مختص پرستاران سلامت جامعه است؟

الف) تمرکز بر گروه‌های آسیب‌پذیر در جامعه

ب) مراقبت از بیماران و افراد در حال مرگ

ج) تعهد نسبت به ارتقای سلامت افراد و خانواده‌ها

د) ارائه مراقبت کل‌نگر به مددجویان در کنار خانواده

۸۸- کدام مدل بهداشتی برای پیش‌بینی اتخاذ رفتار پیشگیرانه طراحی شده است؟

الف) یادگیری اجتماعی

ب) اعتقاد بهداشتی

ج) اشاعه نوآوری

د) ارتقای سلامت

۸۹- ویژگی عمده جمعیت‌های آسیب‌پذیر کدام است؟

الف) ضعف مقابله با بحران‌های اجتماعی

ب) استعداد ابتلا به پیامدهای نامطلوب بهداشتی

(ج) ناتوانی در تطابق با شرایط نامناسب زیستی

(د) خطر نسبی ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج

۹۰- فرد مراقب سالمند، یک زمان محدود و معین برای دفع ادرار و مدفوع در برنامه روزانه سالمند مشخص نموده، کدام اقدام صورت گرفته است؟

الف) سوء رفتار جسمی ب) سوء رفتار عاطفی ج) غفلت عاطفی د) غفلت جسمی

۹۱- بهترین روش پیشگیری از هیپاتیت A کدام است؟

الف) غربالگری خون و کاهش رفتارهای پرخطر

ب) واکسیناسیون قبل از مواجهه

ج) ایزولاسیون فرد آلوده

د) بهسازی مناسب و بهداشت شخصی

۹۲- کدام مطالعه همه‌گیرشناسی، «مطالعه شیوع» نامیده می‌شود؟

الف) آینده‌نگر ب) طولی ج) مقطعی د) گذشته‌نگر

۹۳- پرتوهای یون‌ساز جزء کدام دسته از عوامل بیماری‌زای شغلی است؟

الف) فیزیکی ب) بیولوژیک ج) شیمیایی د) مکانیکی

۹۴- آقای احمدی به دنبال مصرف غذای دریایی خام و نپخته دچار علائم اسهال آبکی و کرامپ شکمی شده است. به نظر شما احتمالاً عامل ایجادکننده بیماری کدام یک از موارد زیر بوده است؟

الف) کلستریدیوم پرفرنزنس

ب) کلستریدیوم بوتولینوم

ج) ویبریو پاراهمولیتیک

د) استافیلوکوک اورئوس

۹۵- سه مرحله اساسی مداخله در بلایا کدام است؟

الف) آمادگی، واکنش، ریکاوری

ب) بررسی، طرح‌ریزی، جبران

ج) شناسایی، آمادگی، اجرا

د) آمادگی، طرح‌ریزی، اجرا

۹۶- کدام گزینه مفهوم «میزان بروز بیماری» می‌باشد؟

الف) میزان وقوع جدید و قدیم بیماری

ب) میزان وقوع جدید بیماری

ج) میزان وفور لحظه‌ای بیماری

د) میزان وفور دوره‌ای بیماری

روان پرستاری

۹۷- در کدام مرحله از ارتباط درمانی پرستار - مددجو، قرارداد شفاهی یا کتبی بین پرستار و بیمار بسته می‌شود؟

الف) قبل از آشنایی ب) آشنایی ج) اقدام د) کسب اعتماد

۹۸- استفاده از تکنیک‌های تداعی آزاد و تفسیر رویا، ریشه در کدام نظریه دارد؟

الف) گشتالتی ب) رفتارگرایی ج) شناختی د) روان تحلیلی

۹۹- جوانی به دنبال مصرف ماده‌ای دچار پر حرفی، سرخوشی، خنده‌های بی‌مورد و افزایش اشتها شده است. در کنترل علائم حیاتی ضربان قلب ۱۲۰ بار در دقیقه، فشار خون ۱۷۰/۱۱۰ میلی‌متر جیوه دارد. احتمال مصرف کدام ماده بیشتر است؟

الف) Heroin ب) Lysergic acid diethylamide ج) Cannabis د) Methadone

۱۰۰- بیمار اسکیزوفرن ابراز می‌دارد که «احساس می‌کنم از بیرون دارم خودم را تماشا می‌کنم»؛ این علامت چه نام دارد؟

الف) مسخ واقعیت ب) مسخ شخصیت ج) هذیان د) اشتغال ذهنی

۱۰۱- آقای ۲۴ ساله‌ای با علائم خنده‌های بی‌مورد، صحبت بی‌ربط و آشغال‌خوری در بخش بستری است. مطمئن‌ترین اقدام برای آماده‌سازی جهت تغییر رفتار وی کدام است؟

الف) تقویت رفتارهای عادی و مطلوب

ب) استفاده از دارو برای کنترل این مرحله از بیماری

ج) تشویق کلامی مثل تحسین و توجه بیمار به ترک عادت‌های نامطلوب

د) استفاده از تنبیه غیربدنی به منظور خاموش کردن رفتار غیرعادی

۱۰۲- پرستار بخش ICU که به دنبال تضاد و ناسازگاری با سرپرستار بخش، دچار رفتارهای پر خاشگرا نه نسبت به بیمار خود می‌شود از چه مکانیسم دفاعی استفاده می‌کند؟

الف) درون فکنی ب) برون فکنی ج) جبران د) جابه‌جایی

۱۰۳- در حمله حاد پانیک کدام اقدام پرستاری اولویت دارد؟

الف) کاهش محرک‌های محیطی

ب) توجه به علایم جسمی و اضطراب

ج) برقراری ارتباط توأم با اعتماد با بیمار

د) حفظ حریم شخصی بیمار

۱۰۴- در صورت بروز احتمال کدام رفتار زیر، برقراری محدودیت فیزیکی بیمار، مجاز است؟

الف) وجود اضطراب توأم با بی‌قراری در بیمار

ب) مصرف مواد اعتیادآور

ج) صدمه زدن به دیگران

(د) فرار از بخش

۱۰۵- در بیماری که بعد از یک هفته دارودرمانی ضدافسردگی، هنوز به طور مشخصی افسرده است، استدلال بالینی مناسب کدام است؟

(الف) غیرمعمول است؛ زیرا تأثیر داروی ضدافسردگی فوری است.

(ب) قابل انتظار است؛ زیرا اثرات مؤثر درمانی بین ۲ تا ۴ هفته طول می کشد.

(ج) غیرمنتظره است؛ زیرا اثرات درمانی چند روز طول می کشد.

(د) بی تأثیر است؛ زیرا احتمالاً دوز دارو ناکافی است.

۱۰۶- در برنامه آموزش خانواده بیماران اسکیزوفرنی، کدام استراتژی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

(الف) افزایش ثبات در خانواده و کاهش احساس گناه و اضطراب

(ب) افزایش وابستگی بیمار به خانواده با رفع نیازهای انسانی

(ج) افزایش نقش بیمار در تصمیم گیری های خانواده

(د) روشن سازی عوامل ایجادکننده بیماری در خانواده و حل تعارضات

۱۰۷- ویژگی اساسی گریز تجزیه ای کدام است؟

(الف) احساس در حال رویا بودن

(ب) سردرگمی در مورد هویت شخصی و اتخاذ هویت جدید

(ج) احساس از دست دادن واقعیت سنجی

(د) تغییر ناگهانی غیرمنتظره از محل همیشگی کار یا زندگی

۱۰۸- بیماری تحت درمان با لیتیوم قرار دارد. به طور ناگهانی دچار دل درد، لرزش شدید و کاهش سطح هوشیاری شده است. در مورد وی، کدام اقدام ممنوع است؟

(الف) قطع لیتیوم

(ب) استفاده از ضد تهوع

(ج) مطلع کردن پزشک

(د) انفوزیون سرم نمکی

۱۰۹- کودکی که از والدین خود عصبانی است ولی ادعا می کند که والدین او عصبانی هستند، از کدام مکانیسم دفاعی استفاده کرده است؟

(د) انکار

(ج) برون فکنی

(ب) واکنش معکوس

(الف) تبدیل

۱۱۰- آرام سازی در کدام یک از روش های رفتار درمانی به کار گرفته می شود؟

(الف) حساسیت زدایی تدریجی

(ب) سرمشق گیری مشارکتی

(ج) غرقه سازی

(د) تقویت مثبت

۱۱۱- خانمی ۴۰ ساله به اورژانس مراجعه نموده است. او دچار وحشت و ترس شدید شده و از درد سینه، سختی تنفس، تپش قلب و گیجی شاکی است؛ بسیار عرق کرده و نگران است که مبادا بمیرد. بررسی های اولیه نشان می دهد که به بیماری قلبی یا ریوی مبتلا نیست. برای این بیمار چه اقدامی را انجام می دهید؟

(الف) او را با شناخت درمانی تسکین می دهید.

(ب) به او می گوئید به بیماری خاصی مبتلا نیست.

(ج) سعی می کنید او را با رفتار درمانی آرام نمایید.

(د) توصیه می کنید به آرامی و عمیق نفس بکشد.

۱۱۲- مهم ترین اقدام پرستاری در مددجویی که هذیان گزند و آسیب دارد و نگران سمی شدن غذای بخش می باشد، کدام است؟

(الف) تمرکز پرستار بر نگرانی ها، ترس ها و احساس ناامنی مددجو

(ب) تمرکز پرستار به صحبت در مورد محتوای هذیان های گزند و آسیب مددجو

(ج) اطمینان دادن به مددجو از کنترل غذاهای بخش توسط تیم بهداشتی

د) تلاش برای قانع کردن مددجو که دلیلی برای ترس از خوردن غذای بخش وجود ندارد

۱۱۳- در کدام یک از اختلالات زیر، بیمار علائم «بازگشت خاطره رویداد آسیب‌زا در قالب تجسم‌های زنده، فلاشبک و کابوس‌های رجعت‌کننده» را تجربه می‌نماید؟

الف) وسواس فکری و عملی

ب) استرس پس از سانحه

ج) فوبیا

د) افسردگی

۱۱۴- مهم‌ترین مراقبت پرستاری در بیمار مبتلا به اختلال خلق دو قطبی (BMD) در فاز حاد بیماری کدام است؟

الف) کاهش تحریکات محیطی درد سینه، سختی تنفس، تپش قلب و گیجی شاکی است؛ بسیار عرق کرده و نگران است که مبادا بمیرد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که به بیماری قلبی یا ریوی مبتلا نیست. برای این بیمار چه اقدامی را انجام می‌دهید؟**

الف) او را با شناخت‌درمانی تسکین می‌دهید.

ب) به او می‌گویید به بیماری خاصی مبتلا نیست.

ج) سعی می‌کنید او را با رفتار درمانی آرام نمایید.

د) توصیه می‌کنید به آرامی و عمیق نفس بکشد.

۱۱۲- مهم‌ترین اقدام پرستاری در مددجویی که هذیان‌گزند و آسیب دارد و نگران سمی شدن غذای بخش می‌باشد، کدام است؟

الف) تمرکز پرستار بر نگرانی‌ها، ترس‌ها و احساس ناامنی مددجو

ب) تمرکز پرستار به صحبت در مورد محتوای هذیان‌های گزند و آسیب مددجو

ج) اطمینان دادن به مددجو از کنترل غذاهای بخش توسط تیم بهداشتی

د) تلاش برای قانع کردن مددجو که دلیلی برای ترس از خوردن غذای بخش وجود ندارد

۱۱۳- در کدام یک از اختلالات زیر، بیمار علائم «بازگشت خاطره رویداد آسیب‌زا در قالب تجسم‌های زنده، فلاشبک و کابوس‌های رجعت‌کننده» را تجربه می‌نماید؟

الف) وسواس فکری و عملی ب) استرس پس از سانحه ج) فوبیا د) افسردگی

۱۱۴- مهم‌ترین مراقبت پرستاری در بیمار مبتلا به اختلال خلق دو قطبی (BMD) در فاز حاد بیماری کدام است؟

الف) کاهش تحریکات محیطی

ب) جلوگیری از شرکت در جمع

ج) در نظر گرفتن تفریحات رقابتی

د) مهار کردن پرخاشگری بیمار

۱۱۵- بیمار وقتی به تنهایی در مکان‌های پر ازدحام عمومی قرار می‌گیرد علائم اضطراب حاد را نشان می‌دهد. این اختلال چه نام دارد؟

الف) گذر هراسی

ب) اضطراب منتشر

ج) هذیان

د) اختلال اضطراب پس از ضربه

۱۱۶- در بخش روان‌پزشکی با یکی از بیماران بسیار کم‌حرف شروع به صحبت می‌کنید؛ کدام یک از بیانیه‌های زیر برای چنین بیماری برای تشویق به صحبت، مناسب است؟

الف) آیا کسی به ملاقات شما آمده است؟

ب) در مورد چه موضوعی دوست دارید صحبت کنید؟

ج) وضع بیمارستان را چگونه می‌بینید؟

د) فکر می‌کنید حالتان بهتر شده است؟

۱۱۷- اولین اولویت مراقبت پرستاری در بیماران افسرده کدام است؟

الف) کنترل توهم شنوایی بیمار

ب) حفاظت سایر بیماران در مقابل حمله بیمار

ج) کنترل هذیان گناه در بیمار

د) حفاظت بیمار در مقابل اقدام به خودکشی

۱۱۸- خانواده‌ای در هنگام ورود اولین فرزند خود به مدرسه دچار مشکل شده است. به نظر شما این خانواده کدام یک از موارد زیر را تجربه می‌کند؟

الف) استرس اجتماعی

ب) بحران موقعیتی

ج) بحران تکاملی

د) تعارض خانوادگی

۱۱۹- کاتاپلکسی (Cataplexy) در کدام قسمت از معاینه روانی (M.S.E) بررسی می‌شود؟

الف) ظاهر ب) روانی حرکتی ج) ادراکات د) هیجانات

۱۲۰- بیمار افسرده‌ای پس از ۳ هفته بستری در بخش، به‌وضوح از خلق بالاتری برخوردار شده و در جمع شرکت می‌کند. او از پیشرفت وضعیت خود رضایت دارد. مهم‌ترین مراقبت پرستاری در مورد این مددجو کدام است؟

الف) پایش عوارض دارویی در بیمار

ب) آموزش مصرف صحیح و به‌موقع دارو

ج) هشدار در مورد علائم عود مجدد بیماری

د) پیشگیری از خطر خودکشی در بیمار

زبان عمومی

Part One: Vocabulary (Continued)

125- Some examples of changing lifestyle are eating nutritious foods, doing daily exercise and smoking

- a) enhancement
- b) persistence
- c) promotion
- d) cessation

126- In order to help students understand mathematical problems, teachers should sufficiently ... problematic points.

- a) collaborate with
- b) compete with
- c) elaborate on
- d) compromise on

127- Drugs in the form of pill or syrup are more easily ... compared to other types.

- a) ingested
- b) dismissed
- c) invaded
- d) distorted

128- Chemicals from the factory caused ... of water and death of animals in the sea.

- a) infusion
- b) immersion

c) contamination

d) congestion

129- Iranian ministry of health has ... a revolutionary program to make substantial changes in the nursing care system.

a) devastated

b) initiated

c) accumulated

d) alleviated

130- Everybody ... him in the meeting due to his effective and interesting presentation.

a) criticized

b) ignored

c) disgusted

d) applauded

131- Some medical interventions are complicated and require ... decisions and actions based on consultation with specialists.

a) reckless

b) accountable

c) sensible

d) trivial

132- When I eat solid food, I have to chew it for a long time before I can ... it.

a) swallow

b) bite

c) grind

d) crush

133- At home, we usually wear ... ; however, we should be really formal at work.

a) casually

b) graciously

c) martially

d) toughly

134- Active people seem to live longer than similar but ... people.

- a) agile b) sedentary c) gloomy d) febrile

135- When the balance of the body chemicals and hormones is ... , some organs may malfunction.

- a) distributed
b) distinguished
c) disturbed
d) dislocated

136- Individuals not vaccinated against smallpox will be ... to it.

- a) recessive
b) resisted
c) dormant
d) vulnerable

137- All students at every level, from elementary to university, need to observe ..., i.e. stick to an arranged or correct time.

- a) penetration
b) reliability
c) reputation
d) punctuality

138- See your dentist if you notice swelling or bleeding in your gums. Early intervention is the key to ... the infection before it becomes serious.

- a) combating
b) confusing
c) diluting
d) mantling

139- An important ... contributing to people's longevity is certainly their healthy lifestyle.

- a) assessment
- b) obstacle
- c) contradiction
- d) variable

140- Antibiotics are useless against flu viruses but there is a home ... that has been passed down through generations and science supports this.

- a) repression
- b) remedy
- c) proportion
- d) appliance

Part Two: Reading Comprehension

Read the following passages carefully, and then answer the questions that follow. Base your answers on the information in the passages only.

Passage 1

Doctors have come to realize that it takes more than medicine for a patient to recover. Patients who are hospitalized spend most of the day in bed feeling sorry for themselves and hoping to get better. It is important to get the patient to interact and get involved in various activities. Health care providers should be educated on the fact that for patients to recover faster there has to be a good relationship between patient and healthcare providers. A survey done at hospitals revealed that patients who had friendly and warm relationships with their nurses and doctors developed strong trusting relationships and in a short time recovered.

Some ways that health care providers can use to promote that friendliness and warmth includes touch. When people are sick they feel like people reject them and don't want to associate with them. This is where the health care providers are expected to go an extra mile. Sit by the patient's bedside, assess how he/she feels to offer reassurance and comfort, touch the patient and smile. Be sure to first consult with the patient because in some cultures touch is considered inappropriate, but a smile is always helpful.

141- Patient recovery is ... by medicine alone.

- a) hard to achieve
- b) recommended
- c) exacerbated
- d) is sure to happen

142- Patients in bed are required to ... activities.

- a) get hospitalized to avoid
- b) feel sorry for missing
- c) get engaged in different
- d) keep away from various

143- Good rapport between the patient and health care provider can ... recovery.

- a) postpone
- b) speed up
- c) rule out
- d) downgrade

144- "Touch" is referred to as ... developing affection and kindness between the patient and health care providers.

- a) an end in
- b) a treatment for
- c) a barrier in
- d) a means of

145- The underlined expression "to go an extra mile" in the second paragraph means to

- a) cover more distance
- b) pay more attention

- c) seek more help
- d) have more rest

Passage 2

In addition to simple pain or sprains which result from overtraining, a new research found that doing excessive endurance exercise - especially during middle-age and beyond - could theoretically lead to unhealthy structural changes in the chambers of the heart. More isn't always better when it comes to running and endurance training. It's also important to realize that what's "vigorous" for one runner is not going to be vigorous for another. For older people or those who haven't broken a sweat in a while, brisk walking might constitute a tough workout.

"I think the best way to exercise and avoid risk of injury revolves around perception of effort, rather than time or duration," he says. "At least twice a week, you want to exercise at an intensity that you perceive as hard." At most, you want to alternate between hard and easy days, so your body has 48 hours to recover.

146- According to the passage,

- a) typically the more exercise you do, the better it is
- b) the more exercise you do, the fewer injuries you get
- c) there is no association between intensity of exercise and its usefulness
- d) in some cases, more exercise means more damage to the body

147- The paragraph preceding this passage most probably discusses

- a) some adverse consequences caused by overtraining
- b) the positive effect of overtraining on the body
- c) pain and heart problem caused by overtraining
- d) the adverse causes of overtraining

148- The author believes that the key issue(s) with regard to the best way to exercise and avoid injury is related to

- a) the time and type of exercise
- b) appropriateness of exercise

- c) one's understanding of efforts
- d) intensity and duration of efforts

149- It is inferred from the passage that

- a) following hard exercise, you should stop giving your body two days of rest
- b) cases of change in the heart chambers due to overtraining have already been observed
- c) even a simple exercise may be considered vigorous for some individuals
- d) quick walking can be considered tough workout only for old people

150- By the expression “those who have not broken a sweat in a while”, the author probably means persons who

- a) are at an old age
- b) have failed to do exercise for some time
- c) have done sports professionally
- d) easily sweat during exercise

Passage 3

Human nutrition is the science of nutrients and other substances in food in relation to the proper functioning of body systems, organs and tissues. A healthy diet positively supports them, while an unhealthy diet causes deficiency-related diseases (e.g. anemia, scurvy, preterm labor, and stillbirth), or nutrient-excess health-threatening conditions (e.g. obesity) as well as common chronic diseases (e.g. cardiovascular diseases, diabetes, and osteoporosis). To compensate for these shortcomings, claims on Health Food (i.e. food marketed to provide human health effects beyond a normal healthy diet, including natural foods, organic foods, whole foods, vegetarian foods or dietary supplements) have recently been put forward in the form of advertising labels for broccoli sprouts, herbal extracts, medicinal plants, herbal teas, honey, organic foods, certain oils, and traditional cultured milk products. Such labeling is, however, criticized by supervisory and controlling agencies. According to FDA, a relationship between a food, food component, or dietary supplement ingredients, and reducing risk of a disease or health-related condition may be imagined although not supported by scientific evidence. The FDA monitors and warns food manufacturers against foods as having specific health effects when no evidence exists to support such statements.

151- According to the passage, preterm childbirth is claimed to result from

- a) specific health effects
- b) deficiency-related diseases
- c) nutrient-excess conditions
- d) chronic systemic diseases

152- According to the passage, an unhealthy diet

- a) compensates for the shortcomings
- b) results from improper labeling
- c) can lead to chronic systemic diseases
- d) includes organic food and dietary supplements

153- According to the passage, FDA ... a relationship between food and lowered risk of diseases and health conditions.

- a) contends
- b) doubts
- c) conceives
- d) discards

154- FDA questions

- a) the relationship between health and diet
- b) dietary supplement ingredients
- c) independently funded research
- d) improperly labeled foods

155- This passage is mainly written to

- a) define nutritional principles for human beings
- b) suggest new labels for health foods without scientific proof

- c) make consumers aware of the claims lacking scientific evidence
- d) criticize health-threatening conditions

Passage 4

Studies show that certain styles of interpersonal communication are less effective than others. Which styles are the ones to avoid? These same studies indicate that the two least effective styles are aggressive and passive communication. On the one hand, an aggressive style involves speaking in a disrespectful manner, expressing anger, or trying to dominate the conversation. For example, a business executive might tell her coworker that his ideas for a new product are terrible. Then she might interrupt him when he tries to explain his ideas. This approach hinders successful communication. It also creates barriers between people. A passive communication style, on the other hand, can be equally unproductive. A passive style might lead a person to hide his or her beliefs, speak quietly, and submit to all demands. Someone working on a fashion design project, for instance, might agree to use a fabric that he thinks is unattractive. He would not express his true feelings to the group. In short, ineffective communicators can fail to influence others either by being too forceful or by hiding their opinions.

156- The author of this paragraph is ... the communication styles mentioned.

- a) indifferent to
- b) in favor of
- c) impartial to
- d) critical of

157- When a teacher imposes her ideas on the students, she makes use of ... of communication.

- a) the passive style
- b) the aggressive style
- c) both the passive and the aggressive styles
- d) either the passive or the aggressive style

158- It is implied that an effective communication involves

- a) aggression by both sides

- b) passiveness by both sides
- c) either passiveness or aggression
- d) neither passiveness nor aggression

159- People who are ... are most probably involved in the passive style of communication.

- a) introverted
- b) violent
- c) assertive
- d) extroverted

160- This paragraph is mostly about the

- a) the barriers between people during communication
- b) unsuccessful communication styles employed by people
- c) appropriate strategies to overcome communication barriers
- d) differences between passive and aggressive people